ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ОТДЕЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

ОТЧЕТ
О ПРИМЕНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ "РЕКИЦЕН-РД" ПРИ ЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ .

В процессе лучевого лечения опухолей малого таза и брюшной полости происходит одновременное облучение прилежащих отделов толстого и тонкого кишечника с нередким последующим развитием ректитов и энтероколитов. Возникающие лучевые эпителииты существенно осложняют проведение лучевой терапии.

Целью исследования являлось изучение влияния энтеросорбента "РЕКИЦЕНА-РД"на развитие лучевых осложнений при лучевой терапии опухолей брюшной полости и органов малого таза.

В исследование включены 22 больных, из которых у 12 диагностирован рак прямой кишки (3-стадия- 2 человека, 4-стадия - 10 человек), у 5 больных рак мочевого пузыря (2-стадия- 2 человека, 3стадия- 3 человека) , у 3 больных -рак предстательной железы (3 стадия-2 человека, 4 стадия- 1 человек) и у 2-х больных лимфосаркома с поражением забрюшинных лимфоузлов. Эффективность применения "РЕКИЦЕНА-РД" оценивалось по клинической симптоматике лучевых осложнений в опытных и контрольных группах и биохимическим показателям крови. Больным проводилась дистанционная гамма-терапия на аппарате "АГАТ-РМ" в СОД 40-60 Гр. До начала и в процессе лучевого лечения все больные получали "РЕКИЦЕН-РД" (1 столовая ложка за 30 мин. до еды 3-4 раза в день в течении 4 недель).

По сравнению с контрольной группой в результате применения препарата "РЕКИЦЕН-РД" наблюдалось уменьшение и укорочение клинических признаков лучевых реакций (уменьшение диспептических расстройств, снижение интоксикации ,уменьшение явлений лучевого

энтероколита и ректита). При применении "РЕКИЦЕНА-РД" лейкопения и тромбоцитопения, возникающие в процессе лучевого лечения , были менее выражены, чем в контрольной группе больных. Наблюдалось снижение биохимических показателей АСТ и АЛТ на фоне "РЕКИЦЕНА-РД".

ВЫВОДЫ: Полученные положительные рецультаты по предупреждению и лечению лучевых реакций с помощью биологически активной добавки "РЕКИЦЕН-РД" свидетельствуют о ее результативности при лучевых осложнениях. "РЕКИЦЕН-РД" может быть использован в лечении онкологических больных,получающих лучевое лечение.

Зам. главного врача
по лечебной работе Н.И.Василькова

Российская Федерация Федеральное лечебно-профилактическое учреждение Кировский областной клинический онкологический диспансер г.Киров

Исп.
заведующая отделением
дистанционной лучевой терапии
Е.Н. Ананьева.